

Nemasys mot harkrankslarver (*Tipula paludosa*)



Nemasys – mot harkrankslarver bekämpning på vall, efter uppkörd vall och golfbanor

Harkrankslarver finner man i vallar och på golfbanor. Nemasys är en naturlig fiende till harkrankslarverna. Att man har harkrankslarver i fältet eller på golfbanan syns genom att det finns många fåglar som letar larver i jordytan.



Bästa tiden för behandling är augusti till oktober.
Behandla två veckor efter att de första vuxna harkrankarna varit synliga.

Behandla när harkrankslarvern är aktiv i marken, vilket normalt inträffar augusti fram till slutet oktober. Vid kraftiga angrepp kan man behöva behandla i april/maj, då måste dosen vara dubbel, stora larver kräver en högre mängd nematoder för att uppnå ett tillfredställande resultat. Upprepa behandling i september med normal mängd nematoder.

När du börjar se vuxna harkrankarna sitta på gräset under slutet juli och augusti vet du att inom några dagar börjar de lägga ägg. Dessa kläcks ganska kort tid efter, beräkna att första behandlingen görs två veckor efter att du noterat de första vuxna harkrankarna flyga omkring.

Behandla fuktig jord när temperaturen i marken är över +12°C. Genomvattning eller 3 – 5 mm regn efter behandling hjälper nematoderna att komma ned till rotsystem där harkrankslarverna finns. Se till att jorden hålls fuktig under minst två veckor efter behandling, nematoderna kräver fuktig jord för att fungera optimalt.

Nemasys nematoden (*Steinernema feltiae*), söker upp harkrankslarven och attackerar den genom naturliga öppningar. Inne i larven frigör nematoden en bakterie som bekämpar larven. Nematoderna reproducerar sig inne i larven och nya nematoder söker efter nya larver.

Nemasys finns i förpackning om 250 miljoner, dosering **höstbehandling 1,0 miljard nematoder/ha och vårbehandling 2 miljarder/ha.**



We create chemistry